

Test non invasivi per l'*H. pylori*³



¹³C-UREA BREATH TEST (UBT)³

- Sensibilità (95%-100%) e specificità (95%-100%) più elevate
- I PPI devono essere sospesi 14 giorni prima del test; deve essere esclusa una terapia antibiotica in corso o recente



RICERCA SIEROLOGICA DI ANTICORPI ANTI-*H. PYLORI*³

- Sensibilità (74,4%) e specificità (59%) più basse
- Economico, semplice e rapido
- Non distingue tra infezioni in corso e pregresse




RICERCA FECALE DELL'ANTIGENE DI *H. PYLORI*³

- Sensibilità (>95%) e specificità (>95%) lievemente inferiori rispetto all'UBT, ma più elevata del test sierologico
- Rapido, semplice, poco costoso

RILEVAMENTO DIRETTO NELLE FECI TRAMITE PCR

Rielaborazione grafica di dati testuali, Rif: Malfertheiner et al. 2022⁴, di dati testuali e da Tab. 3, Rif: Malfertheiner et al. 2023³, dalla Figura 1, Rif: Koletzko, L, et al. 2019²⁴



SINTOMI DI ALLARME:^{3,22}



- disfagia
- anemia
- ittero
- feci nere/sangue nelle feci
- perdita di peso involontaria
- vomito



Endoscopia



NEGATIVITÀ per dispepsia dovuta a *H. PYLORI*



Dispepsia organica o funzionale



POSITIVITÀ per dispepsia dovuta a *H. PYLORI*

